小形で，2～3 層の細胞よりなる。造卵器は中褥の殆んど全面に亘って比較的多数個生じ，頸部はやや短小で，4 系列をなす頸細胞は前列 5～6 個，後列 4 個の細胞よりなり，最下位のものは大形で頸部の座をなす。造精器は中褥の下方において葉状部の中部以下に仮根に伍して生じ，球形乃至倒卵形で直径 55～60 μ あり，底細胞は環細胞と等幅・等高で，その上膜は陥没して底膜にまで達するが，時には平坦のこともある。

本種の前葉体は前記 8) のアオガネシダ *Tarachia Wilfordii* に類似し，1) 翼細胞の膜は厚角になることなく，2) 仮根は褐色を呈することによって区別される。

Corrigenda 正 誤 表

Journ Jap. Bot. **35** (8) : 225—228

Hideo TOYOKUNI : Einige Bemerkungen über die sogennante *Gentiana secta* Ohwi

page (頁)	Line (行)	for (誤)	read (正)
225	2	**socta**	**secta**
225	5	1838	1938
225	8	herausgab, und er	herausgab.
225	9	diser Enjian	dieser Enzian
225	14—15	deutlich	deutliche
225	15	lasst	lässt
225	31	Fakultat	Fakultät
225	31	Universitat	Universität
225	33	Masamun fur	Masamune für
226	7	heit	hielt
226	9	Gatung	Gattung
226	12	einschliesze	einschliesse
226	14	Subsp.	subsp.
226	16	*seca*	*secta*
226	32	Ûber	Ůber
226	34	*Gentianella*	*Gentianella*
227	24	Pass	Pass,
227	29	Areales	Areals
227	33	International	" International

Journ. Jap. Bot. **35** (7) : 201–204

Hideo TOYOKUNI : Über die systematische Stellung von *Gentiana yakushimensis*

201	6	*Kudo*	*Kudoa*
202	11	pro.	pro
203	31	Kurioi	Kurio
204	12	her liche	herzliche